

السی کا پیداواری منصوبہ



پاکستان میں زراعت کی ترقی کیلئے کوشاں گرو ٹیک زراعت سے متعلق ٹیکنالوجی کھیتی ہے، جو پاکستان کے زراعت کے شعبے میں محرومیوں اور عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جدید حل مہیا کرتی ہے۔

Follow us on  www.growtechsol.com  [GROWTECHServices](https://www.youtube.com/GROWTECHServices)  [growtechsol](https://www.facebook.com/growtechsol)  [growtechsol](https://www.instagram.com/growtechsol)



اسی ایک اہم تیلدار فصل ہے۔ اس کے بچ میں 39 تا 44 فیصد
جلد خشک ہونے والا تیل ہوتا ہے۔ اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ
تیل وارنش، پینٹ، چھاپہ خانہ کی سیاہی، اعلیٰ قسم کے صابن
اور اعلیٰ کالر بنانے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے روایتی قسم کی
سویٹ (پنیاں) بنانے میں استعمال ہوتی ہے جو سردیوں کے
موسم کی ایک پسندیدہ غذا ہے اور اسکی ادویاتی اہمیت بھی بہت
زیادہ ہے۔

السی کی اقسام

1. چاندنی

السی کی اس قسم کے پھول سفید رنگ کے اور پودے مضبوط ہوتے ہیں اس لئے فصل آندھی وغیرہ کی صورت میں گرنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اس کے بچ میں تیل کی مقدار 40 سے 42 فیصد ہوتی ہے۔ یہ قسم کیڑوں اور بیماریوں کے خلاف خاصی قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 15 سے 20 من فی ایکڑ ہے۔ عمومی پیداوار 8 تا 10 من فی ایکڑ حاصل ہوتی ہے۔

2. روشنی

یہ قسم 2018 میں کاشت کے لیے منظور ہوئی۔ اس قسم میں بھی بیماریوں اور کیڑوں کے خلاف بہتر قوت مدافعت موجود ہے اور یہ گرنے کے خلاف بھی اچھی قوت مدافعت رکھتی ہے۔ اس کی پیداواری صلاحیت 28 من فی ایکڑ تک ہے۔

شرح بیج اور وقت کاشت



علاقے	شرح بیج	وقت کاشت
آبپاش علاقے	6 کلو گرام فی ایکڑ	15 اکتوبر تا 15 نومبر
بارانی علاقے	8 کلو گرام فی ایکڑ	

طریقہ کاشت

- اسی کی کاشت کیلئے درمیانی میرا زمین بہتر رہتی ہے۔ زمین کی تیاری کے لئے دو تا تین مرتبہ ہل اور سہاگہ چلائیں اور ہموار زمین کا خاص خیال رکھیں۔
- اسی بذریعہ ڈل کاشت کریں اور قطاروں کا باہمی فاصلہ 1 فٹ رکھیں۔

کھادوں کا استعمال

کھادوں کا استعمال یوروں میں فی ایکڑ	مقدار غذائی اجزا	زمین کی زرخیزی
ایک بوری ڈی اے پی + دو تھائی بوری یوریا + آدھی بوری ایس اوپی / ایم او پی یا ایک بوری ٹی ایس پی + ایک بوری یوریا + آدھی بوری ایس اوپی / ایم اوپی	23 کلو گرام نائٹروجن فی ایکڑ 23 کلو گرام فاسفورس فی ایکڑ 12 کلو گرام پوٹاش فی ایکڑ	اوسط زرخیز زمین

گروٹیک آپ کے رقبے میں زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے ہر کھیت کے اندر مختلف مقدار میں کھادوں کی سفارش کرتی ہے، تاکہ فصل کی بھرپور پیداوار حاصل کی جاسکے۔

السی کی بیماریاں اور انکا انسداد

اکھیرا یا مرجھاؤ:



بیماری سے متاثرہ پودے کی ابتدائی طور پر جڑیں گلنا شروع ہوتی ہیں اور آہستہ آہستہ پودے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آخر کار پودا خشک ہو کر مر جاتا ہے، متاثرہ پودے کو اکھاڑا جائے تو جڑ کا چھلکا پھٹا ہوا نظر آتا ہے۔

انسداد: بیج کو پھپھوند کش زہر تھائیو فینیٹ میتھائل بحساب 2.5 گرام فی کلو گرام بیج لگا کر کاشت کریں۔ یا تھائیو فینیٹ میتھائل 1 کلوگرام فی ایکڑ حملہ نظر آتے ہی فلد کریں۔

پودوں کا جھلساؤ یا بلائٹ:



یہ بیماری بیج سے پھیلتی ہے، ابتدائی طور پر ننھے پودوں پر ظاہر ہوتی ہے جس سے پودے کا تنا سوکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ متاثرہ پودے کے پتوں پر چھوٹے چھوٹے بھورے رنگ کے ہم مرکز دھبے بن جاتے ہیں جو بعد میں سیاہی مائل ہو جاتے ہیں۔

انسداد: بیج کو پھپھوند کش زہر تھائیو فینیٹ میتھائل بحساب 2.5 گرام فی کلو گرام بیج لگا کر کاشت کریں۔ بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ٹیبا کونازول + ٹرائی فلوکسی سٹروبن 65 گرام فی 100 لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کریں۔



السی کی کنگلی:

یہ بیماری ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے۔ بیماری کی علامات پودے کے پتوں اور تنے پر چھوٹے چھوٹے دھبوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ دھبوں کا رنگ چمکدار اور سنگترے کے جیسا ہوتا ہے، بیماری کا حملہ بڑھنے پر ان دھبوں کی رنگت سیاہ ہو جاتی ہے۔ شدید حملے کی صورت میں پودے کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے اور پیداوار متاثر ہوتی ہے۔

انسداد: بیماری کی علامات ظاہر ہونے کی صورت میں ٹیبا کونازول + ٹرائی فلوکسی سٹروبن 65 گرام فی 100 لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کریں یا پروپی کونازول 200 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی میں حل کر کے سپرے کریں۔

السی کے نقصان دہ کیڑے اور ان کا تدارک



دیمک:

دیمک کا حملہ زیادہ تر خشک موسم میں پودے کے زیر زمین حصوں پر ہوتا ہے۔ حملہ شدہ پودے سوکھ جاتے ہیں اور پھینچنے پر آسانی سے اکھاڑے جاسکتے ہیں۔

تدارک: فیپرونل 5 فیصد 960 ملی لیٹر یا فیپرونل 80 فیصد 60 گرام فی ایکڑ سپرے کریں۔



ٹوکا:

اس کیڑے کے بالغ اور بچے دونوں تیل دار اجناس کے اگتے ہوئے پودوں کو کھا کر تباہ کر دیتے ہیں۔ شدید حملہ کی صورت میں فصل دوبارہ کاشت کرنی پڑتی ہے۔

تدارک: لیمبڈا ساٹھیلوٹھرین 2.5 فیصد 330-250 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔

دھبے دار بگ :

بالغ اور بچے دونوں ہی پتوں، پھلیوں اور شگوفوں سے رس چوستے ہیں۔ جس کی وجہ سے پتے پیلے ہو کر خشک ہو جاتے ہیں۔

تدارک: کلوتھیانیڈن 200 ملی لیٹر فی ایکڑ سپرے کریں۔



جڑی بوٹیوں کا انسداد

جڑی بوٹیوں کے انسداد کے لئے گوڈی کریں۔ پہلی گوڈی پہلے پانی سے پہلے اور دوسری بعد میں کریں۔

آبیاشی

السی کی فصل کو 3 سے 4 پانی خصوصاً پھول نکلنے سے پہلے، پھول نکلنے کے بعد اور ڈوڈیاں بننے پر دیں۔

کٹائی

مقررہ وقت پر کاشت کی گئی فصل آخر اپریل میں یا شروع مئی میں پک کر تیار ہو جاتی ہے لہذا ہر وقت برداشت ضروری ہے۔

مندرجہ بالا تمام سہولیات آپ گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے دیئے گئے بار کوڈ
کو سکین کر کے گروپاک لیپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کے علاوہ اب آپ ہماری
فری سروسز سے فوری فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
زرعی رہنمائی، موسم کی صورتحال، تازہ خبریں، دستاویزات، سرگرمیاں، فارم
مینجمنٹ



پاکستان میں زراعت کی ترقی کے لیے کوشاں گروٹیک زراعت سے متعلق ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو پاکستان کے زراعت کے شعبے میں محرومیوں اور عدم استحکام
کو ختم کرنے کے لیے جدید حل مہیا کرتی ہے۔

Follow us on:

www.growtechsol.com

www.facebook.com/growtechsol

<https://www.youtube.com/c/GROWTECHservices>