

پیاز کی منافع بخش کاشت گروٹیک کے پیداواری پروگرام کے ساتھ!



اہمیت:

- ❖ دنیا کی قدیم ترین سبزی ہے۔
- ❖ معدنی اجزا مثلاً کیلشیم، فولاد، فاسفورس کے علاوہ پروٹین اور وٹامن سی کا مرکب۔
- ❖ گرمیوں میں لو سے بچاتا ہے۔
- ❖ خون کی شریانوں میں جمی ہوئی چربی تحلیل کرتا ہے۔
- ❖ دل کے امراض اور بلڈ پریشر سے محفوظ رکھتا ہے۔

آب و ہوا:

- سرد اور مرطوب آب و ہوا کی ضرورت۔
- نشوونما کے لیے 20 تا 24 ڈگری سینٹی گریڈ موزوں سمجھا جاتا ہے۔
- گنڈیاں بننے کے عمل کے دوران موزوں درجہ 25 تا 28 اور لمبے دن سازگار ہوتے ہیں۔
- پاکستان میں چھوٹے دنوں والی اقسام (10 تا 12 گھنٹے لمبا دن) اور درمیانے دنوں والی اقسام (13 تا 14 گھنٹے لمبے دن) کامیاب ہیں۔
- لاہور، ملتان، حیدرآباد، قلات اور مالاکنڈ ڈویژن کاشت کے حوالے سے اہم علاقے ہیں۔

پیاز کی اقسام:

- پیاز کی اقسام کو رنگ، خوشبو، ذخیرہ کرنے، چھوٹے، درمیانے اور لمبے دنوں کے لحاظ سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔
- پاکستان میں چھوٹے اور درمیانے دنوں والی کامیاب ہیں۔
- پھلکارا اور دیسی سرخ سندھ اور پنجاب کی مشہور اقسام ہیں۔
- درآمد شدہ اقسام ہمارے موسمی حالات میں کامیاب نہیں رہی ہیں۔

رقبہ کاشت اور پیداوار

پیداوار فی ایکڑ	رقبہ کاشت (ایکڑ)	پیاز/علاقہ
100 سے 120 من	70 ہزار	پنجاب
120-180 من	1 لاکھ 30 ہزار	سندھ
170-180 من	25 ہزار	سرحد
160-170 من	53 ہزار	بلوچستان

وقت کاشت

پنیری منتقل کرنے کا وقت	پنیری اگانے کا وقت	علاقے
• مئی، جون	• مارچ، اپریل	پنجاب (پہاڑی)
• اگست، ستمبر • جنوری، فروری	• جولائی (موسم خزاں) • اکتوبر، نومبر	پنجاب (میدانی)
• دسمبر، جنوری	• اکتوبر، نومبر	خیبر پختون خواہ
• اگست، ستمبر	• جولائی (چھوٹے بلبوں سے کاشت) • جولائی، اگست	سندھ (زیریں علاقے)
• دسمبر، جنوری	• اکتوبر	بالائی سندھ

شرح تخم:

- پنیری کے لیے: 2 سے 3 کلو گرام فی ایکڑ 4 سے 5 مرلہ زمین فی ایکڑ کے لیے)
- چھٹے کے لیے: 6 سے 9 کلو گرام فی ایکڑ
- بلبوں کے لیے: 500 سے 550 کلو گرام چھوٹے -نوٹ: بلب (15-20 ملی میٹر قطر)

پنیری کی کاشت:

- زمین اچھی طرح تیار کرنے کے بعد 4 فٹ چوڑی اور 10 فٹ لمبی کیاریاں بنائیں۔
- 2 انچ کے فاصلے پر 1 انچ گہری لائن لگائیں اور بیج کاشت کر دیں بیج گلی سرٹی کھاد سے ڈھانپ دیں اور اوپر پرالی یا سرکنڈہ سے ڈھانپ دیں اور فوراً فوارے کی مدد سے اس طرح پانی دیں کے نمی بھی باقی رہے اور کیاریوں میں پانی بھی نہ کھڑا ہو۔

پنیری منتقلی:



- پنیری منتقل کرنے سے 2-3 گھنٹے پہلے ہلکا پانی دیں۔
- پودے کھیلیوں کے دونوں طرف 3-4 انچ کے فاصلہ پر لگائیں۔
- پنیری منتقلی کے وقت بیمار اور کمزور پودے علیحدہ کر دیں۔
- پنیری صبح یا شام کے وقت منتقل کریں۔

کھادوں کا استعمال

نام کھاد	وقت استعمال	مقدار	طریقہ استعمال
ڈی-اے-پی	زمین کی تیاری کے وقت	1.5 سے 2 بوری	بیجائی سے قبل کھلیاں بنانے سے پہلے زمین میں ملا دیں
ایس او پی (50 کلو والا بیگ)		1 بوری	
پوٹاشیم ہیومیٹ 47 فیصد		8 کلو	
زنک سلفیٹ 10 فیصد	پنیری منتقلی کے 30 دن بعد	10 لیٹر	فلڈ کریں۔
پوٹاشیم ہیومیٹ 13.5 فیصد	پنیری منتقلی کے 40-50 دن بعد	10 لیٹر	فلڈ کریں
ایس او پی (25 کلو والا بیگ)	گنڈھیاں بنتے وقت (55-60 دن بعد)	12.5 کلو	یوریا کے ساتھ ملا کر فلڈ کریں
امونیم سلفیٹ	گنڈھیاں بنتے وقت (55-60 دن بعد)	1 بوری	فلڈ کریں

پیاز کی فصل میں زنک کا استعمال:



- زنک کی کمی کو پورا کر کے پودوں کو صحتمند بنائے۔
- زمین کو زرخیز بنا کر پودوں کی نشوونما کو تیز کرے۔
- دیگر کھادوں کی افادیت میں اضافہ کرے۔
- گنڈیوں کی تعداد اور کوالٹی میں اضافہ کرے۔
- کلوروفل کی مقدار میں اضافہ کرے۔

پیاز کی فصل میں پوٹاشیم ہیومیٹ کا استعمال

پودوں کی شاندار بڑھوتری - بھرپور پھول و پھل



- زمین کی ساخت کو بہتر بنا کر پیاز کی جڑوں کی کارکردگی میں اضافہ کرے۔

- زمیں کو نرم اور بھر بھرا بنا کر بڑھوتری میں شاندار اضافہ کرے۔

- اجزائے صغیرہ اور کبیرہ کا استعمال بہتر کرے۔

- زمینی وتر کو زیادہ دیر تک قائم رکھے۔

- جمی فاسفورس کو گھلائے پودوں کے لئے قابل استعمال بنائے۔

پیاز کی فصل میں پوٹاش کا استعمال

- زمین کی ساخت کو بہتر بنا کر پیاز کی جڑوں کی کارکردگی میں اضافہ کرے۔
- زمینی بیماریوں سے پودوں کو محفوظ بنا کر بڑھوتری میں شاندار اضافہ کرے۔
- پوٹاش اور سلفر پیاز کی گندھیاں بنانے کی صلاحیت میں اضافہ کرے۔
- پیاز کے سائز میں اضافہ کر کے موٹا اور صحت مند بنائے۔
- پیاز کے معیار اور مقدار میں اضافہ کرے۔

آبیاشی

- پہلے 3 پانی 7 یا 8 دن کے وقفے سے لگائیں
- اس کے بعد آبیاشی کا وقفہ بڑھایا جا سکتا ہے۔



جڑی بوٹیوں کا کنٹرول

اٹ سٹ
Trianthema monogyna



مدھانہ
Dactyloctenium aegyptium



سوانکی
Echinocloa colonuma



باتھو
Chenopodium album



قلفہ
Portulaca oleracea



تاندلہ
Digera spp.



ڈیل
Cyperus Spp



جڑی بوٹیوں کے کنٹرول کے لئے ٹی۔ جیٹ نوزل استعمال کریں۔
ہمیشہ صاف پانی کا استعمال کریں۔
پانی کی فی ایکڑ مقدار 120 لیٹر رکھیں۔

جرڑی بوٹیوں کی تلفی


- پیاز کی فصل میں تمام اقسام کی جرڑی بوٹیاں (چوڑے، نوکیلے پتوں والی اور ڈیلا) اگتی ہیں اور پیداوار میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ فصل میں جرڑی بوٹیوں کی تعداد کو دیکھتے ہوئے 1-2 دفعہ گوڈی کریں۔ یہ عمل پودوں کو زیادہ خوراک حاصل کرنے کے ساتھ بہتر اور صحت مند گٹھے بنانے میں مدگار ثابت ہوگا۔

جرڑی بوٹیاں	کیمیائی زہر	مقدار	وقت استعمال
نوکیلے و چوڑے پتوں والی جرڑی بوٹیاں	پینڈی میتھالین 33 فیصد + ایس میٹولاکلور 96 فیصد	800 ملی لیٹر + 400 ملی لیٹر	بیجائی کے 24 گھنٹوں کے بعد اسپرے کریں۔
نوکیلے و چوڑے پتوں والی جرڑی بوٹیاں	آکسی فلوروفن + پینڈی میتھالین + میٹولاکلور 50 فیصد	500 ملی لیٹر	بیجائی کے 24 گھنٹوں کے بعد اسپرے کریں۔
نوکیلے و چوڑے پتوں والی جرڑی بوٹیاں	آکسی فلوروفن	200-250 ملی لیٹر فی 120 لیٹر پانی	بیجائی کے 30 دن بعد استعمال کریں۔
سوانکی، کھبل	قوزیلوفوپ پی میتھائل 15 فیصد	350 ملی لیٹر فی 120 لیٹر پانی	جب جرڑی بوٹیاں 2-4 پتوں کی حالت میں ہوں۔

پیاز کے ضرر رساں کیڑے اور ان کا تدارک



تمھرپس:



- یہ پیاز کا سب سے خطرناک رس چوسنے والا کیڑا ہے۔
- یہ کیڑا پودے کے پتوں کی درمیانی کونپلوں میں موجود ہوتا ہے۔
- اسکے بالغ اور بچے دونوں وہاں سے رس چوس کر نقصان کرتے ہیں اور حملہ شدہ پودوں کے پتے چڑھ مڑھ ہو جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ کالے ہو جاتے ہیں۔

پلیسٹ	زہر	مقدار فی ایکڑ
تمھرپس	کلورفینا پائر 36 فیصد	200-150 ملی لیٹر
	ایبامیکٹن 1.8 فیصد	400 ملی لیٹر

میگٹس / پیاز کی سنڈی:

- یہ سنڈی پیاز کی بیج والی فصل میں پھولوں کے گچھوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔
- پروانہ زردی مائل بھورا جبکہ سنڈی سبزی مائل اور جسم پر لمبے رُخ دھاریاں ہوتی ہیں۔



کنٹرول:

400 ملی لیٹر	ایما میگٹس + لیوفینوران 3 فیصد
200 ملی لیٹر	ایما میگٹس بینزوئٹ 1.9 فیصد

پیاز کی بیماریاں





پرپیل بلاچ (ارغوانی جھلساؤ) :

- پتوں پر ہلکے جامنی رنگ کے کناروں والے دھبے پڑ جاتے ہیں۔ بیج پیدا کرنے والی دُنڈی گل سڑ جاتی ہے اور پیاز پر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔
- روئیں دار پھپھوندی کے شدید حملہ کی صورت میں اس بیماری کے حملے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے



روئیں دار پھپھوندی: Downy Mildew



- یہ بیماری پتوں اور بیج والے تنوں پر سیاہی مائل روئیں دار دھبوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ اگر موسم سرد ابرآلود اور ساتھ ہلکی بارش ہو تو جھلساؤ کی طرح جھلساؤ مرجھاؤ کا منظر پیش کرتا ہے اور پیداوار 60-75% تک کم ہو جاتی ہے۔
- نرسری سے منتقل شدہ فصل پر روئیں دار پھپھوندی کا حملہ زیادہ ہوتا ہے۔ پرانے پتوں کی نوکیں پیلی ہو کر گرنا شروع کر دیتی ہیں۔





سٹیم فیلیم بلائٹ: Stemphylium leaf blight



Stemphylium leaf blight

- جب فصل 3-4 پتوں کی حالت میں ہو تو پتوں کے نوکدار کناروں پر حملہ ہوتا ہے۔
- 20-24 سینٹی گریڈ اور 70 فیصد نمی بیماری کے پھیلاؤ میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔
- پتوں کی اوپر والی سطح سے نیچے کی طرف بیماری کا پھیلاؤ۔
- ہلکے زردی مائل سے گہرے بھورے دھبے۔
- پوری فصل مرجھائی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔

سٹیم فیلیم بلائٹ - علامات



فیوزیریم ڈیمپنگ آف:



- فنگس جڑوں پر حملہ کرتی ہے۔
- جڑیں پہلے گرمی سرخ اور پھر سیاہ ہو جاتی ہیں۔
- پودا چوٹی سے مرجھانہ شروع کرتا ہے۔
- فنگس زمین میں موجود ہوتی ہے۔
- نمدار اور گیلی زمین میں زیادہ پھیلتی ہے۔



- فصل کو صرف دن کے وقت پانی دیں۔
- جڑی بوٹیوں کی بروقت تلفی کریں۔
- زمین کو دھوپ لگوا کر خشک کریں۔
- فصلوں کا ہیر پھیر کریں۔

پنک روٹ (*Phoma terrestris*)

- جرڑیں ہلکی گلابی سے گہرے رنگ میں تبدیل اور آخر میں ارغوانی رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔
- جرڑیں ٹرانسپیرینٹ اور ان پر خشک پانی کے دھبے نمودار ہونے لگتے۔
- بلب چھوٹے رہ جاتے۔



بیماریوں کا کیمیائی کنٹرول

بیماری	زہر کا نام	مقدار	طریقہ استعمال
روئیں دار پھپھوندی، ارغوانی جھلساؤ، سفید جھلساؤ،	سائموکسنل + مینکوزیب 72 فیصد	600 گرام فی 100 لیٹر پانی	• بجائی کے 1 ماہ بعد حفاظتی اسپرے کریں۔ • حملہ نظر آتے ہی اسپرے کریں۔
	ایزاکسی سٹروبن + کلورو تھیونل 56 فیصد	350 ملی لیٹر فی 100 لیٹر پانی	
	پائراکلو سٹروبن + میٹی رام 60 فیصد	600 گرام فی 100 لیٹر پانی	
روئیں دار پھپھوندی	پروپی نیب 70 فیصد	500 گرام فی 100 لیٹر پانی	
تنے اور گٹھوں کا گلاو (سٹیم فیلیم بلائیٹ) پینک راٹ، ڈیمپنگ آف	فوسٹائل ایلومینیم 80 فیصد	1 کلو گرام فی ایکڑ	فلڈ کریں۔
	تھائیوفینیٹ میتھائل 70 فیصد	2 کلو گرام فی ایکڑ	فلڈ کریں۔

برداشت:

- نرسری سے کاشت کی ہوئی موسم خزاں کی فصل جنوری سے مارچ تک برداشت کی جاتی ہے۔
- سیٹس کے ذریعے کاشت کی ہوئی فصل نومبر تا وسط دسمبر میں برداشت ہوتی ہے۔
- موسم بہار کی فصل آخر اپریل سے مئی تک برداشت ہوتی ہے

نوٹ:


جب پیاز اپنی نشوونما اور جسامت بڑھانا چھوڑ دے، نئے پتوں اور جڑوں کی بڑھوتری رک جائے اور پودے کا تنیا خشک ہو کر جھک جائے (15 سے 20 فیصد پودے ٹوٹنا شروع) برداشت کے لیے فصل برداشت کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔

پیاز کی کاشت اور مرحلہ وار نشوونما کے حصول کی اہم معلومات

آپاشی سے متعلق اہم معلومات

پہلے تین پانی 7-8 دن کے وقفہ سے لگائیں۔

موسم کی صورتحال اور فصل کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپاشی کا تعین کریں۔



فصل کی برداشت

76-90 دن

گندھی کی بڑھوتری

66-75 دن

گندھی کا بننا

51-65 دن

پتوں کی بڑھوتری

31-50 دن

25-30 دن

جڑی بوٹیوں کے تدارک کے لحاظ سے اہم مراحل

مختلف کھادوں کے استعمال کے اہم مراحل

نوٹ : فاسفورس کھادوں کی مکمل مقدار جبکہ پوٹاش کھادوں کی نصف مقدار کا استعمال بجائی کے وقت کرنا چاہیے۔ فصل کا دورانیہ کاشتہ علاقے اور فصل کی مخصوص قسم کے لحاظ سے مختلف ہو سکتا ہے۔

پاکستان میں زراعت کی ترقی کیلئے کوشاں گروٹیک زراعت سے متعلق ٹیکنالوجی کمپنی ہے، جو پاکستان کے زراعت کے شعبے میں محرومیوں اور عدم استحکام کو ختم کرنے کے لیے جدید حل مہیا کرتی ہے۔

Follow us on



www.growtechsol.com



GROWTECHServices



growtechsol



growtechsol